

Paziente con Mielofibrosi
(INT1, INT2, alto rischio)

SCORE DIPSS >> SCORE IPSS >>

Splenomegalia Sintomatica

Splenomegalia non sintomatica

Splenomegalia Severa

Splenomegalia non Severa

Splenomegalia Severa

Splenomegalia non Severa

Rischio INT1, INT2, o alto

SCORE DIPSS >>

Rischio Basso

SCORE DIPSS >>

Rischio INT1 non refrattario basso

SCORE DIPSS >>

Rischio INT2 o alto

SCORE DIPSS >>

Rischio INT1 refrattario

SCORE DIPSS >>

Rischio INT1 refrattario

SCORE DIPSS >>

Rischio INT2 o alto

SCORE DIPSS >>

RACCOMANDAZIONI

ruxolitinib

SCHEDULE >>

RACCOMANDAZIONI

NO ruxolitinib

SCHEDULE >>

RACCOMANDAZIONI

NO ruxolitinib

SCHEDULE >>

RACCOMANDAZIONI

ruxolitinib

SCHEDULE >>

RACCOMANDAZIONI

ruxolitinib

SCHEDULE >>

SINTOMI MALATTIA

NO SINTOMI

RACCOMANDAZIONI

Se compare almeno uno dei sintomi è raccomandato l'utilizzo di ruxolitinib

SCHEDULE >>

REFERENZE >>

MPN10 >44

SCORE MPN10 >>

Prurito (valore >6 nello score MPN10)

Calo ponderale >10% in 6 mesi

Febbre non spiegata

RACCOMANDAZIONI

NO ruxolitinib

SCHEDULE >>

REFERENZE >>