

Sede	TOT	Valutazione generale					Non/Poco Ril.	Abb.Ril.	Ril.	Molto Ril.
	24	1	2	3	4	5				
Adams-13 e la diagnosi di PTT: quale impatto sulla predittività della recidiva. Come curo il paziente refrattario e il paziente in recidiva - F. Peyvandi	182	0,00	2,00	40,00	86,00	54,00	1,1%	22,0%	47,3%	29,7%
della emopoiesi: a) la nicchia staminale emopoietica b) gli ematogoni c) la cellula staminale emopoietica - R. M. Lemoli	177	1,00	3,00	46,00	82,00	45,00	2,3%	26,0%	46,3%	25,4%
Come curo la Leucemia Linfatica Cronica dopo la prima linea - A. Cuneo	189	1,00	2,00	35,00	104,00	47,00	1,6%	18,5%	55,0%	24,9%
Come diagnostico e curo l'amiloidosi AL G. Merlini	185	2,00	2,00	43,00	78,00	60,00	2,2%	23,2%	42,2%	32,4%
Come diagnostico la malattia minima residua - A. Venditti	180	1,00	1,00	39,00	85,00	54,00	1,1%	21,7%	47,2%	30,0%
Come curo il linfoma mantellare - M. Martelli	183	0,00	2,00	37,00	91,00	53,00	1,1%	20,2%	49,7%	29,0%
Come curo le infezioni fungine nel paziente neutropenico e trapiantato - M. Picardi	171	1,00	3,00	40,00	90,00	37,00	2,3%	23,4%	52,6%	21,6%
Come curo il Mieloma Multiplo refrattario e in recidiva precoce - M. Offidani	202	5,00	8,00	41,00	98,00	50,00	6,4%	20,3%	48,5%	24,8%

